

introrsum longitudinaliter dehiscentes. *Stylus* filiformis, *stigmatē* obtuso, interdum depresso. *Drupa* corticata, unilocularis, nucleis 1-rarius 2-3 monospermis. *Embryo* in albumine subcartilagineo inversus aut horizontalis.

*STYRAX BENZOIN*, Dryand.

*S*: foliis ovato-oblongis acuminatis subtus albido-leprosis, racemis compositis longitudine fere foliorum, floribus 7-9-10-andris.

*rescit*: in montosis circa Buitenzorg; in sylvis occidentalibus montis Salak; in districto Hariang Provinciae Krawang.

*Floret*: Decembri; Majo.

*Nomen*: polu minjang.

*STYRAX VILLOSUM*, Bl.

*S*: foliis oblongis acuminatis basi acutiusculis inaequalilateribus subtus villosiusculis, racemis simplicibus folio brevioribus, floribus 6-rarius 5-andris.

*Crescit*: in sylvis montis Salak.

*Floret*: Octobri; etc.

*Nomen*: . . . . .

*STYRAX JAVANICUM*, Bl.

*S*: foliis oblongis acutis basi rotundatis glabris ad costam subtus parum tomentosus, racemulis con-

fertis

fertis multifloris petiolo brevioribus, floribus hexandris (arbor 40-50 ped.).

*Crescit*: in montanis Parang Provinciae Tjanjor, ac in sylvis montis Burangrang.

*Floret*: Augusto; etc.

*Nomen*: . . . . .



## S A P O T E A E.



### MIMUSOPS, Linn.

*Calix* 3-rarius 6-partitus; laciniis biserialibus, exterioribus majoribus. *Corolla* 24-partita; laciniis biserialibus, 16 exterioribus patentibus, interioribus erecto-conniventibus. *Stamina* 8, basi corollae inserta, et annulo villosa ovarii adnexa, cum squamis (filament. steril.) alternantia. *Ovarium* 8-loculare, loculis 1-ovulatis. *Stylus* 1. *Stigma* obtusum, depressum. Fructus baccatus, ex abortu plerumque 1-locularis, nancis in loculamentis solitariis 1-spermis. *Albumen* carnosum, tenue. *Embryo* subincurvus, erectus, *cotyledonibus* subplicatis.

SECT. 1. fructu ex abortu 1-loculari.

### MIMUSOPS ACUMINATA, Bl.

*M*: foliis alternis ovalibus acuminatis basi parum inaequalibus (arbor altissima 80-120 ped. alt.).

*Cres-*