

STEMONURUS SECUNDIFLORUS, Bl.

S: foliis oblongis acutis basi angustatis coriaceis glabris aveniis, spicis apice 5-4-fidis, floribus secundis (arbor 40 ped.).

Crescit: in sylvis montium Salak et Gede.

Floret: Decembri.

Nomen: Kimeong.

STEMONURUS JAVANICUS, Bl.

S: foliis oblongis utrinque acuminatis coriaceis glabris venosis, cymis solitariis geminisve densifloris.

Crescit: in sylvis montanis Provinciae Buitenzorg.

Floret: Martio.

Nomen: Kitongerret.

Variet. foliis ovalibus utrinque acuminatis submembranaceis glabris, junioribus ad costam infra puberis, cymis dichotomis solitariis (an species?).

Crescit: in sylvis insulae Nusae Kambangae.

Floret: Novembri, etc.

SECT 2. ANACOLOSA.

Filamenta in praefloratione erecta, haud exserta.

STEMONURUS FRUTESCENS, Bl.

S: foliis elliptico-oblongis obtuse acuminatis basi acutis venosis glabris ad costam subtus puberulis, pedunculis confertis unifloris.

Cres-

Crescit: in sylvis altioribus montis Sallak.

Floret: Decembri, etc.

Nomen:



T H Y M E L A E A E.



DAPHNE, Linn.

Calix infundibuliformis, 4-rarius 5-partitus, marcescens. *Stamina* 8, rarius 10, inclusa. *Stylus* brevis. *Stigma* capitatum. *Drupa* baccata, nuda.

DAPHNE DECANDRA, Bl.

D: foliis alternis ovalibus acutiusculis basi oblique-attenuatis serrulatis glabris, floribus glomeratis axillaribus, caule arborescente.

Crescit: ad pedem montis Tjerimai.

Floret: Augusto, etc.

Nomen:

DAIS, Linn.

Flores involuerati. *Calix* corollinus longus, infundibuliformis, deciduus; limbo 5-rarius 4-fido. *Stamina* 10 l. 8, fauci inserta, inaequalia. *Ovarium* 1-2-ovulatum. *Stylus* filiformis, *stigmatate* capitato, depresso. *Drupa* baccata, nucleis 1-2, 1-spermis. *Embryo* exalbuminosus (secundum Cl. Gaertn. in *D. cotinifolia* carnosus, et ex Cl. Sprengel