

ceolatis acuminatis basi angustatis subcoriaceis subtus ad nervum medium pubescentibus; paniculis subramosis puberulis. — *B. lanceolatae* WIGHT Icon. I. tab. 237 accedens, sed foliis subsessilibus ad nervum medium dorso pubescentibus distincta. Arbuseula 15—20 ped., ramulis teretibus, gilvis, glabris, ultimis obsolete angulatis, ad apices fuscotomentosis. Folia 3—7½ poll., 1—2½ poll. lata v. minora, ad apicem saepe nervo exerto mucronulata, laurina, nitida, excepto nervo medio subtus pubescente glabra. Paniculae axillares et ad summitates ramulorum, 3—6 poll. longae, laxae, patentes, puberulæ. Flores parvi, albi, in cymis dispositi. — In sylvis montanis insulae Sumatrae.

422. *Buchanania macrophylla* Bl.: ramulis teretibus ad apices tomentosis; foliis cuneato-oblongis apice rotundatis v. retusis basi in petiolum decurrentibus coriaceis supra glabris subtus stellato-puberulis; paniculis elongatis subramosis tomentosis. — Arbor trunco 30—40 ped., magnitudine foliorum excellens. Ramuli crassitie digitii minoris, ad apices cum foliis juvenilibus adhuc conduplicatis tomento denso fulvo vestiti. Folia 8 poll.—1½ ped., 3½—7 poll. lata, venis transversalibus permultis parallelis in nervum marginalem arcuato-confluentibus subtus elevatis nervoque intermedio supra applanato v. non-nihil immerso in paginâ dorsali valide extuberante percursa; petioli 1½—3 poll., crassi, dorso rotundato-gibbi, striolati et tomento furfuraceo obsiti, supra plano-excavati et sericeo-velutini, basi decurrente foliorum anguste marginati. Paniculae subterminales, erectae, spithameæ ad pedales usque, cum floribus in speciminiibus nostris adhuc in expansis interrupte glomerulatis tomento fusco furfuraceo obtectæ. — In Sumatrâ, Borneo cet.

423. *Buchanania auriculata* Bl.: ramulis teretibus ad apices tomentosis; foliis cuneato-oblongis apice rotundatis v. retusis ad petiolorum basin margine decurrente auriculatis coriaceis glabris; paniculis subramosis tomentosis. — Arbor 30 ped., ad summitates ramulorum foliis nondum expansis et inflorescentiâ tomento furfuraceo fusco obtectis. Petioli 1½—1¾ poll., foliorum basi decurrente marginati, marginibus revolutis, ad basin utrinque in auriculam minutam rotundam dilatatis, dorso convexi, supra plano-excavati. Lamina 5—10 poll., 2—3½ poll. lata, margine subundulata, supra nitida, venis transversalibus utrinque, sed in paginâ dorsali paulo validius prominibus. — In montanis insularum Sumatræ, Borneo cet.

Species minus cognitæ.

424. *Buchanania?* *zeylanica* Bl.: ramulis angulatis plane glabris; foliis cuneato-oblongis obtusis v. plerumque rotundatis v. retusis coriaceis glabris. — Foliorum formâ cum *B. intermediâ* WIGHT Icon. I. Tab. 325 plane congruens, cuius tamen folia nunquam coriacea, quod illam a *B. latifoliâ* ROXB. distinguit. An potius ad *B. latifoliam* ROXB. referri possent specimina nostra? At foliorum basis in speciminiibus nostris zeylanicis (partim ex J. BURMANNI, aliis e VAN ROIEN Herbario oriundis, ubi stirps ab indigenis *Ettembe* vocatur) nunquam obtusata, sed in petiolum angustata. Petioli 4—10 lin. longi.